

Bijsluiter Lammetjesmelk

Voerschema schapen

Mengverhouding schapenlammeren: 200 gram poeder op 1 liter water.
Vanaf week 8: 165 gram poeder op 1 liter water.

Bereidingstemperatuur: 40-45°C.

Voerschema bij flesvoeding:

Leeftijd	Hoeveelheid per voerbeurt	Aantal voerbeurten per dag
Dag 1	Biest of Colstart Plus	3-5x
Dag 2	100 ml	4x
Dag 3&4	150 ml	3x
Dag 5&6	200 ml	3x
Dag 7&8	250 ml	3x
Dag 9-12	300 ml	3x
Dag 13&14	350 ml	3x
Week 3&4	450 ml	3x
Week 5-7	650 ml	2x
Week 8&9	600 ml	2x
Week 10	500 ml	1x

Voerschema bij voorraadvoeding: Verstrek de eerste 24 uur na de geboorte biest of Colstart Plus. Daarna Lammetjesmelk onbeperkt beschikbaar stellen op omgevingstemperatuur. Breng de eerste dagen de lammeren 2 tot 3 keer daags aan de speen en controleer de melkopname. Controleer en reinig de spenen regelmatig.

Opmerking: Dit voerschema is slechts een richtlijn. De voergift dient aangepast te worden aan het gewicht van het dier. Stel vanaf de 2^e week onbeperkt ruwvoer (*voorkeur hooi*), krachtvoer (*lammerkorrel met een Ca/P verhouding 3:1*) en vers drinkwater ter beschikking.

Voerschema geiten

Mengverhouding geitenlammeren: 165 gram poeder op 1 liter water
Vanaf week 8: 125 gram op 1 liter water.

Bereidingstemperatuur: 40-45°C

Voerschema bij flesvoeding:

Leeftijd	Hoeveelheid per voerbeurt	Aantal voerbeurten per dag
Dag 1	Biest of Colstart Plus	3-5x
Dag 2	100 ml	4x
Dag 3&4	150 ml	3x
Dag 5-8	200 ml	3x
Dag 9-12	250 ml	3x
Dag 13&14	300 ml	3x
Week 3&4	400 ml	3x
Week 5-7	600 ml	2x
Week 8&9	500 ml	2x
Week 10	400 ml	1x

Voerschema bij voorraadvoeding: Verstrek de eerste 24 uur na de geboorte biest of Colstart Plus. Daarna Lammetjesmelk onbeperkt beschikbaar stellen op omgevingstemperatuur. Breng de eerste dagen de lammeren 2 tot 3 keer daags aan de speen en controleer de melkopname. Controleer en reinig de spenen regelmatig. Vanaf week 4 t/m week 7 de hoeveelheid beperken tot 2x500 ml per dier per dag (per dier 1 speen). Gedurende week 8 t/m 10 1x500 ml per dier. Na week 10 kan gespeend worden, wanneer de geiten voldoende ruw- en krachtvoer opnemen.

Opmerking: Dit voerschema is slechts een richtlijn. De voergift dient aangepast te worden aan het gewicht van het dier. Stel vanaf de 2^e week onbeperkt ruwvoer (*voorkeur hooi*), krachtvoer (*lammerkorrel met een Ca/P verhouding 3:1*) en vers drinkwater ter beschikking.